

# NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 02/01/2015

## Dénomination du médicament

### **DRILL TOUX SECHE SANS SUCRE 5 mg/5 ml ENFANTS, sirop édulcoré au maltitol liquide**

Bromhydrate de dextrométhorphane

## Encadré

**Lisez attentivement cette notice car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Ce médicament est une spécialité d'AUTOMEDICATION qui peut être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin.
- La persistance des symptômes, l'aggravation ou l'apparition de nouveaux troubles, imposent de prendre un avis médical.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

## Sommaire notice

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE DRILL TOUX SECHE SANS SUCRE 5 mg/5 ml ENFANTS, sirop édulcoré au maltitol liquide ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DRILL TOUX SECHE SANS SUCRE 5 mg/5 ml ENFANTS, sirop édulcoré au maltitol liquide ?
3. COMMENT PRENDRE DRILL TOUX SECHE SANS SUCRE 5 mg/5 ml ENFANTS, sirop édulcoré au maltitol liquide ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER DRILL TOUX SECHE SANS SUCRE 5 mg/5 ml ENFANTS, sirop édulcoré au maltitol liquide ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### **1. QU'EST-CE QUE DRILL TOUX SECHE SANS SUCRE 5 mg/5 ml ENFANTS, sirop édulcoré au maltitol liquide ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

#### Classe pharmacothérapeutique

ANTITUSSIF

(R: système respiratoire)

#### Indications thérapeutiques

Traitement de courte durée des toux sèches et des toux d'irritation chez l'enfant de plus de 6 ans et pesant plus de 20 kg.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DRILL TOUX SECHE SANS SUCRE 5 mg/5 ml ENFANTS, sirop édulcoré au maltitol liquide ?

### Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### Contre-indications

**Ne prenez jamais DRILL TOUX SECHE SANS SUCRE 5 mg/5 ml ENFANTS, sirop édulcoré au maltitol liquide VOUS (OU VOTRE ENFANT) NE DEVEZ PAS PRENDRE** ce médicament si:

- vous (ou votre enfant) êtes allergique à l'un des constituants,
- vous (ou votre enfant) êtes asthmatique,
- vous (ou votre enfant) êtes insuffisant respiratoire,
- vous (ou votre enfant) êtes traité par les IMAO (médicaments prescrits au cours de certains états dépressifs),
- vous allaitez.

EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

**Faites attention avec DRILL TOUX SECHE SANS SUCRE 5 mg/5 ml ENFANTS, sirop édulcoré au maltitol liquide:**

#### **Mises en garde spéciales**

**NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.**

- En cas de maladie chronique (au long cours) des bronches ou des poumons s'accompagnant de toux avec crachats, un avis médical est indispensable.
- Ne traitez pas par ce médicament une toux grasse. Dans ce cas, la toux est un moyen de défense naturelle nécessaire à l'évacuation des sécrétions bronchiques.
- Si la toux de votre enfant devient grasse, s'accompagne d'encombrement, de crachats, de fièvre, prenez l'avis de votre médecin.
- Ce médicament contient du glucose et du maltitol. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au glucose et au maltitol (maladie héréditaire rare).
- Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle sodique (E219) et du parahydroxybenzoate de propyle sodique (E217) et peut provoquer des réactions allergiques.

#### **N'utilisez ce médicament qu'avec précaution**

- En cas de survenue de fièvre, comme en cas d'aggravation ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours, ne pas augmenter les doses au delà de ce qui est préconisé, ne pas prendre conjointement un autre antitussif, mais **CONSULTEZ VOTRE MEDECIN**,
- N'associez pas un médicament fluidifiant des sécrétions bronchiques (expectorant, mucolytique) avec cet antitussif.

### Interactions avec d'autres médicaments

### Prise ou utilisation d'autres médicaments

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS NOCIVES ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, notamment avec les IMAO (médicaments prescrits au cours de certains états dépressifs), SIGNALEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT TRAITEMENT EN COURS.

Ce médicament contient un antitussif le **dextrométhorphan**. D'autres médicaments en contiennent ou contiennent un autre antitussif. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées ([voir Posologie](#)).

### Interactions avec les aliments et les boissons

#### Aliments et boissons

La consommation de boissons alcoolisées doit être évitée pendant la durée du traitement.

### Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

### Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

#### Grossesse et allaitement

##### Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez,

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

#### Grossesse

Il est possible de prendre ce médicament pendant votre grossesse, à condition que cela soit pendant un temps bref (quelques jours) et aux doses recommandées.

Cependant, en fin de grossesse, la prise abusive de dextrométhorphan peut entraîner des effets néfastes chez le nouveau-né. Par conséquent, il convient de toujours demander l'avis de votre médecin avant de prendre ce médicament et de ne jamais dépasser la dose préconisée.

#### Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel.

De trop fortes doses de dextrométhorphan administrées chez les femmes qui allaitent peuvent entraîner des pauses respiratoires ou des baisses du tonus du nourrisson. En conséquence, la prise de ce médicament est contre-indiquée pendant l'allaitement.

### Sportifs

Sans objet.

### Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Ce médicament provoque parfois une somnolence discrète et transitoire ou des vertiges risquant d'être dangereux chez les conducteurs de véhicules (automobile...) et les utilisateurs de certaines machines. Ce phénomène s'atténue après plusieurs prises. Il peut être utile de commencer le traitement le soir.

Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées.

### Liste des excipients à effet notoire

#### Informations importantes concernant certains composants de DRILL TOUX SECHE SANS SUCRE 5 mg/5 ml ENFANTS, sirop édulcoré au maltitol liquide:

maltitol,

parahydroxybenzoate de méthyle sodique (E219), parahydroxybenzoate de propyle sodique (E217).

### 3. COMMENT PRENDRE DRILL TOUX SECHE SANS SUCRE 5 mg/5 ml ENFANTS, sirop édulcoré au maltitol liquide ?

## Instructions pour un bon usage

Sans objet.

## Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

N'utilisez pas ce médicament chez l'enfant de moins de 6 ans

### **Posologie**

RESERVE A L'ENFANT DE 6 A 15 ANS ET PESANT PLUS DE 20 KG.

La posologie est fonction du poids de votre enfant:

- enfant de plus de 20 kg jusqu'à 30 kg, soit de plus de 6 ans jusqu'à environ 10 ans: 1 cuillère-mesure (soit 5 ml) par prise, à renouveler si nécessaire au bout de 4 heures, sans dépasser 4 cuillères-mesures par jour,
- enfant de 30 à 40 kg, soit environ de 10 à 13 ans: 1 cuillère-mesure + 1/2 cuillère-mesure (soit 7,5 ml) par prise, à renouveler si nécessaire au bout de 4 heures, sans dépasser 6 cuillères-mesures par jour,
- enfant de 40 à 50 kg, soit environ de 13 à 15 ans: 2 cuillères-mesures (soit 10 ml) par prise, à renouveler si nécessaire au bout de 4 heures, sans dépasser 8 cuillères-mesures par jour.

En cas de maladie du foie: consultez votre médecin afin qu'il puisse adapter la posologie.

### **Mode et voie d'administration**

Voie orale.

Utiliser la cuillère-mesure de 5 ml, la rincer à l'eau après utilisation.

### **Fréquence d'administration**

#### **Espacez les prises d'au minimum 4 heures**

Ce médicament n'est à prendre qu'aux horaires où survient la toux. Par exemple, pour une toux ne survenant que le soir, une prise unique de ce médicament le soir peut suffire.

### **Durée du traitement**

La durée d'utilisation est limitée à 5 jours

Comme tous les médicaments, DRILL TOUX SECHE SANS SUCRE 5 mg/5 ml ENFANTS, sirop édulcoré au maltitol liquide est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

- vertiges, somnolence,
- nausées, vomissements, constipation,
- possibilité de réactions allergiques (éruption cutanée, rougeur ou gonflement du visage, de la langue et de la gorge, rarement gêne respiratoire de survenue brutale): arrêtez le traitement et consultez votre médecin,
- en raison de la présence de maltitol, risque de troubles digestifs et de diarrhée.

Des cas d'abus ont été rapportés.

### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

### **5. COMMENT CONSERVER DRILL TOUX SECHE SANS SUCRE 5 mg/5 ml ENFANTS, sirop édulcoré au maltitol liquide ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

### **Date de péremption**

Ne pas utiliser DRILL TOUX SECHE SANS SUCRE 5 mg/5 ml ENFANTS, sirop édulcoré au maltitol liquide après la date de péremption mentionnée sur le flacon.

### **Conditions de conservation**

Ce médicament doit être conservé à température ambiante.

### **Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration**

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

### **6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

#### **Liste complète des substances actives et des excipients**

**Que contient DRILL TOUX SECHE SANS SUCRE 5 mg/5 ml ENFANTS, sirop édulcoré au maltitol liquide ?**

**La substance active est:**

Bromhydrate de dextrométhorphane ..... 0,1 g

Pour 100 ml.

Une cuillère-mesure de 5 ml contient 5 mg de bromhydrate de dextrométhorphane.

**Les autres composants sont:**

Parahydroxybenzoate de méthyle sodique (E219), parahydroxybenzoate de propyle sodique (E217), maltitol liquide, arôme caramel (contient notamment du glucose), acide lactique, eau purifiée.

#### **Forme pharmaceutique et contenu**

**Qu'est-ce que DRILL TOUX SECHE SANS SUCRE 5 mg/5 ml ENFANTS, sirop édulcoré au maltitol liquide et contenu de l'emballage extérieur ?**

